

Очковый (африканский) пингвин - *Spheniscus demersus*



Пингвин получил название за специфический рисунок на голове. Имея верхнюю сторону тела черную, а нижнюю белую, очковый пингвин хорошо отличается наличием на груди узкой черной подковообразной полосы, которая спускается по бокам туловища к лапам. Кроме того, белая полоса огибает сзади бока головы и щеки очкового пингвина и затем идет вперед к глазам и далее в направлении клюва, но не доходит до него. Длина туловища очковых пингвинов 61-86 см. Единственный африканский вид пингвинов, гнездится на южном и юго-западном побережье Африки, омываемом холодным Бенгельским течением. В связи с освоением гнездовых биотопов человеком, за последнее столетие численность очкового пингвина упала в десятки раз и сейчас оценивается в 50000-170000 пар.



Очковые пингвины практически оседлы, внегнездовые кочевки совершают недалеко от

Пингвин африканский *Spheniscus demersus*

Автор: Administrator

26.12.2005 03:46 - Обновлено 09.01.2006 20:28

берега, питаются мелкой стайной рыбой (в основном мальками сельди, анчоусов, сардин), которой богаты холодные течения. Предпочитаемый размер добычи 5-12 мм.

Начало сезона размножения зависит от климатических условий. На северо-западе ареала пик насиживания приходится на ноябрь-январь, на юго-западе - на май-июль, на востоке - на апрель-июнь. Выкармливание длится до 80 дней. Птенцы покрыты буровато-серым пухом, первый юношеский наряд серовато-голубой, без ярких полос и узоров. К размножению приступают с 4 лет.

Источник: www.apus.ru . По материалам: Е.А.Коблик "Разнообразие птиц".